

De Groenzoom

Struweelvogels



Struweelvogels

- Zanglijster	3
- Roodborsttapuit	4
- Kneu	5
- Blauwborst	6
- Patrijs	7
- Rietzanger	8

Zanglijster

Kenmerken

- Lichte borst met pijlpuntige vlekken.
- Geelbeige bovenbuik.
- De bovendelen zijn egaal bruin.
- Korte donkere stevige snavel

Biotoop:

Bos, park en tuin

Voedsel-en broedbiotoop:



Struikgewas, grasvelden, open plekken in bossen en op paden, dat is waar zanglijsters hun voedsel zoeken. Het nest wordt verscholen in een dichte struik of in een boom: hoe onopvallender hoe liever het de zanglijster is. Dichte vochtige bossen, zoals rabattenbossen en elzenhakhoutpercelen, zijn favoriet

Voedsel:

Insecten, slakken, wormen, duizendpoten, pissebedden, maar ook fruits, zoals appels en bessen.

Broedperiode:

Eind maart – juli



Roodborsttapuit

Roodborsttapuit

Kenmerken:

Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een oranje borst maar het zijn de mannetjes die echt opvallen. De vrouwtjes hebben naast de oranje borst bruin gestreepte bovendelen en twee witte vlekken op de bovenzijde. Mannetjes hebben deze vleugelvlekken ook en hebben daarnaast een (deels) witte stuit, witte halszijden en een zwarte kop.

Biotoop:

Duinen, heide, hoogveen, rietland en ruigte

Voedsel-en broedbiotoop:


Roodborsttapuiten zoeken hun voedsel en nestgelegenheid in structuurrijke open gebieden. Vaak zijn dit overgangszones van open gebied (heide) naar bos. De toppen van lage bomen en struiken worden veel als uitkijk- en zangpost gebruikt. Het nest wordt laag bij de grond gemaakt, goed verscholen in een dichte vegetatie.

Voedsel:

Voornamelijk insecten maar ook wormen, spinnen, slakken, zaden en bessen

Broedperiode:

2 tot 4 legsels



Kneu

Kneu

Kenmerken

Bovendelen bruin met donkere handpennen met witte randen.

Mannetjes zijn op de borst en voorhoofd rood gekleurd maar in het najaar verandert dit in roodbruin. Daarnaast hebben mannetjes een grijs achterhoofd, bij vrouwtjes en onvolwassen vogels is dit bruingrijs. Vrouwtjes en onvolwassen vogels hebben daarnaast ook een zwak gestreepte borst en kruin en hebben geen rood in het verenkleed.

Biotoop

Buitengebied, duinen, rietland en ruigte, rudere terreinen

Voedsel- en broedbiotoop



Open gebieden met veel ruige begroeiing, struikgewas en allerlei planten is precies wat kneuen graag zien. Ze nemen genoeg met enkele struiken om in te broeden.

Voedsel

Zaden van distels en andere planten en knoppen

Broedperiode:

Vanaf eind april
Twee of drie legsels per jaar



Blauwborst

Blauwborst

Kenmerken

Zowel het mannetje als vrouwtje hebben een lichte wenkbrauwstreep en een roestbruine staartbasis. Het mannetjes heeft een blauwe kin en borst met in het midden een witte vlek. Aan de onderkant wordt de blauwe borst begrensd door een zwarte band met daaronder een roestbruine vlek. Bij het vrouwtje ontbreekt de blauwe borst.

Biotoop

Beken en meren, duinen, hoogveen, moeras, oevers, plassen, rivieren

Voedsel- en broedbiotoop

Gevarieerde, natte gebieden met open delen en een rijke struweel- en loofboombegroeiing die rijk zijn aan insecten. Dat is wat een blauwborst graag ziet. De geleidelijke overgang van rietmoerassen naar moerasbos vormt een uitstekend leefgebied. Blauwborsten broeden op de grond in dicht struikgewas, bij voorkeur in een kommetje op een dicht begroeide helling.


Voedsel

Insecten, larven, slakjes en soms ook bessen.

Broeiperiode:

Eind mei – juli

Een, soms 2



Patrijs

Patrijs

Kenmerken

Goed gecamoufleerd met een bruin en grijs gestreept kleed, kastanjebruine strepen op de flanken en een grijze borst. Keel en gezicht zijn oranjebruin en op de buik zit een grote donkerbruine vlek.

Biotoop

Akkers, graslanden, hoogveen, weiden (kleinschalig)

Voedsel- en broedbiotoop



Het biotoop waaraan de patrijs zich in West-Europa heeft aangepast zijn akkers, ruige akkerranden met akkeronkruiden, weiden met hagen, met bloemen begroeide dijken, enzovoort. Het nest wordt door de patrijs op de grond gemaakt, in een dichte begroeiing.

Voedsel

blaadjes, zaden en insecten

Broeidperiode

april-mei



Rietzanger

rietzanger

kenmerken

Geelbruin verenkleed met een opvallende lichte wenkbrauwstreep, gestreepte kop en rug

Biotoop

Beken en meren, moeras, oevers, rietland en ruigte

Voedsel- en broedbiotoop

Rietzangers zoeken hun voedsel in een liefst dichte vegetatie bestaande uit jong en overjarig riet, zeggen, bitterzoet en andere moerasplanten. Hun nest bouwen ze in een dichte rietbegroeiing, bovenop de dichtere ondergroei. Het nest hangt dus niet op enige hoogte tussen de rietstengels.

voedsel

Op het menu staan allerlei insecten: muggen, eendagsvliegen enzovoort.

Broedperiode

mei-juli

