

De Groenzoom

Weidevogels



1. Levenscyclus

1.1 soorten

Slobeend	3
Kievit	4
Grutto	5
Krakeend	6
Wintertaling	7
Tureluur	8
Veldleeuwerik	9
Graspieper	10
Kuifeend	11
Gele kwikstaart	12
Watersnip	13
Wulp	14
Zomertaling	15
Scholekster	16

Slobeend

Mannetjes hebben een groene kop, witte borst en kastanje bruine buik en flanken. Vrouwtjes lijken qua kleed op de wilde eend maar hebben een donkerbruine buik en de groene spiegel heeft geen witte achterrand.

Biotoop:

Beken en meren, moeras, oevers, weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Vochtige weilanden met plassen, meren en rivierarmen of sloten, gelegen in nat laaglandgebied in het gematigde klimaatgebied.

Voedel:




De slobeend eet plantaardig materiaal van het wateroppervlak

Broedperiode:

Maart- augustus

Broedduur inclusief eileg: 34 dagen

Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel in sloot onder begeleiding van het vrouwtje. Vliegen na 6 weken.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.

Kievit

Kievit

Bovendelen donker met groenpaarse metaalglans. Onderdelen wit met een roestrode onderstaart. Kop is zwart-wit getekend met een lange, dunne kuif.

Biotoop:

Akkers, gorzen en slikken, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Kieviten zoeken hun voedsel, dat bestaat uit allerlei ongewervelden, vooral tussen de vegetatie en op de bodem. Open gebieden met een rijke bodemfauna zijn voor de kievit een ideale biotoop. Het nest bestaat uit een klein kommetje van gras dat, nauwelijks zichtbaar, gemaakt wordt in een graspol.

Voedel:

voornamelijk ongewervelden


Levenssycclus:

Vanaf februari keren de kieviten vanuit hun overwinteringsgebieden terug naar hun broedplaats in Nederland.


Broeiperiode is van maart tot juli.

Na een kleine maand komen de eieren uit. Kort na de geboorte brengen ze de kuikens van het onbeschermde nest naar meer beschut grasland. De eerste drie weken schuilen de jongen onder de vleugels van de moeder. Eten doen ze zelfstandig. Na ongeveer 5 weken kunnen ze vliegen.

De echte najaarstrek begint in september.



Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Sovon 2002). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer in het broedseizoen.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.

Grutto

Grutto

Grutto heeft een zeer lange, rechte snavel.

Biotoop:

Hoogveen, intergetijdenzone, wad, weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Natte of vochtige, matig voedselrijke kruidenrijke graslanden met een lange vegetatie die in de ruimte gevarieerd is, en welke laat in de zomer (augustus / september) gemaaid wordt.

Voedel:

Regenwormen en emelten

Broedperiode:

Eind april tot begin juni


Broedduur inclusief eileg: 28 dagen

Kuikens: verlaten direct het nest en


zoeken voedsel onder begeleiding van de ouders. Vliegen na 4 weken



Van belang voor de overleving van gruttokuikens is voldoende oppervlakte grasland die niet voor 15 juni wordt gemaaid. De vuistregel voor het minimale percentage oppervlakte met uitgestelde maaidatum gehanteerd: de helft van het aantal broedparen met jongen in het gebied. Vb. gebied met 20 paren met jongen moet minimaal 10% van de oppervlakte een uitgestelde maaidatum hebben.



Deze gegevens zijn afkomstig van het project Gruttokaart 2004. Weergegeven is het aantal broedparen per vierkante kilometer.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.

Krakeend

Krakeend

Mannetjes hebben een bruinige kop en een zwart achterlichaam met lichtbruine staart. De rest van het lichaam is grijs en zeer fijn getekend, wat het beste te zien is op de borst. De schouderveren zijn opvallend lang en licht grijsbeige van kleur. Vrouwtjes zijn veel minder opvallend en lijken sterk op de wilde eend. De witte spiegel, de witte buik en de snavel vormen de belangrijkste kenmerken om vrouwtjes van wilde eenden te onderscheiden.

Biotoop:

Beken en meren, moeras, oevers, plassen, rivieren

Voedsel- en broedbiotoop:

Laaggelegen, open zoetwatergebieden met een ruige, soortenrijke oevervegetatie. Soms wordt ook in brakwatergebieden gebreed.

Voedel:

vooral planteneters

Broedperiode:

april-juni

Broedduur inclusief eileg: 34 dagen


Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel in sloot onder begeleiding van het vrouwtje. Vliegen na 6 weken.



Wintertaling

Wintertaling

Mannetjes hebben een kastanjebruine kop met een donker groene vlek rond het oog die doorloopt tot het achterhoofd. Het lichaam is grijs met een horizontale witte streep en een gevlekte borst. De staart is zwart met gele vlekken op de zijkant. Vrouwtjes lijken op een vrouwtje wilde eend. Vrouwtjes hebben een bruin kleed met donkere vlekken en strepen. De kruin is donker en de spiegel is glanzend groen.



Biotoop:

Beken en meren, hoogveen, moeras, oevers, plassen

Voedsel- en broedbiotoop:

Waterrijke gebieden met een welige begroeiing van de oevers vormen het leefgebied van de wintertaling, maar alleen op de voorwaarde dat het er rustig is. Watersport en recreatie in 'wintertalinggebied' hebben onherroepelijk hun weerslag op de soort.



Voedel:

Allerlei dierlijk en plantaardig materiaal



Broedperiode:

April- Juni

De broedperiode loopt van begin april tot midden september. Begin april balts, in april-september nesten en paren met jongen.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.

Tureluur

Tureluur

turuluur heeft zwarte snavel met rode basis en de bovenzijde is bruin, borst en flanken gestreept en lichte oogring en wenkbrauwstreep. De poten zijn rood.

Biotoop:

Hoogveen, intergetijdenzone, moeras, oevers, plassen, rivieren, wad, weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Tureluurs zoeken hun voedsel op slikken en in natte structuurrijke weilanden. Het nest bestaat uit een in een graspol verscholen kommetje.

Voedel:



insecten en wormen

Broedperiode:

half april-juni

Broedduur inclusief eileg: 26 dagen

Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel onder begeleiding van de ouders. Vliegen binnen 4 weken.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Grijsbruin kleeft met een gestreepte borst en bovendien. De borst is licht geelbruin en de streping op de borst contrasteert met de witte buik. Veldleeuweriken kunnen een korte, stompe kuif oprichten.

Biotoop:

Akkers, duinen, heide, weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Boomloze open gebieden met een korte vegetatie; graanakkers, weidegebieden en vooral heidevelden.

Voedel:

Insecten



Broedperiode:

Vanaf eind april

Twee tot drie legsels per jaar

Broedduur inclusief eileg: 15 dagen

Kuikens: blijven 12 dagen in het nest, waar ze worden gevoerd door hun ouders. Vliegen na 2 weken.



Graspieper

Graspieper

Bovendelen van de graspieper zijn olijfgroen met donkere strepen. De kop is minder opvallend getekend dan die van de sterk gelijkende Boompieper met een minder opvallende oogstreep en een smallere, iets minder lichte mondstreep. De borst is gelig of grijsig getint met zwarte streping. De buik en staartzijden zijn wit

Biotoop:

Akkers, buitengebied, graslanden, heide, hoogveen, weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Open gebieden met een tamelijk korte vegetatie, met daarin liefst ook overjarige gras- of heidepollen. Daarin wordt het nest verstopt. In het gras worden insecten en ongewervelde dieren (vaak wormen en rupsen) gezocht.

Voedel:

Insecten en andere ongewervelden, 's winters ook zaden



Broedperiode:

Vanaf begin mei

Twee legsels per jaar

Broedduur inclusief eileg: 15 dagen

Kuikens: blijven 12 dagen in het nest, waar ze worden gevoerd door hun ouders. Vliegen na 2 weken.



Kuifeend

Kuifeend

Mannetjes zijn zwart met witte flanken, vrouwtjes overwegend bruin met lichtere flanken. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een kuif, maar deze is bij mannetjes wat langer.

Biotoop:

Beken en meren, moeras, plassen, rivieren, vennen

Voedsel- en broedbiotoop:

zoete wateren zoals plassen, sloten en vijvers, maar ook op de toendra en langs de kust

Voedel:



voornamelijk schelpdieren zoals zoetwatermossels, maar ook kreeftachtigen, insecten en plantaardig materiaal

Broedperiode:

mei-juni

Broedduur inclusief eileg: 34 dagen

Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel in sloot onder begeleiding van Vliegen na 7 weken.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart heeft een lange 'kwikkende' staart en heeft een blauwgrijze kop met brede witte wenkbrauwstreep, gele onderdelen en olijfgroene bovendelen.

Biotoop:

Akkers, boomgaarden, bruggen, buitengebied, cultuurlandschappen, graslanden, platteland, rivieren, ruderaal terreinen, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Broeden op vochtige weilanden, kaalslagen, moerassen, aan oevers van meren en andere waterrijke gebieden met voedselrijke graslanden. Gele kwikstaarten zoeken hun voedsel voornamelijk in voedselrijke weilanden op de kleigronden.

Voedel:



Insecten

Broedperiode:

Mei- juni

Broedduur inclusief eileg: 15 dagen

Kuikens: blijven 12 dagen in het nest, waar ze worden gevoerd door hun ouders. Vliegen na 2 weken.



Watersnip

Watersnip

Het kleed is hoofdzakelijk bruin van kleur met een gestreepte kop en bovendelen. De flanken zijn donker gebandeerd en de buik is wit. Heeft een lange rechte snavel.

Biotoop:

Graslanden, hoogveen, intergetijdenzone, moeras, oevers, rietland en ruigte, weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Watersnippen zoeken hun voedsel, dat hoofdzakelijk bestaat uit kleine gewervelde en ongewervelde dieren, in de bovenste laag van slijkige bodems en veen.



Voedel:

kleine ongewervelde en gewervelde dieren

Broedperiode:

mei-augustus

De broedperiode loopt van midden maart tot eind september. Vanaf midden maart balts en van begin april-eind september nesten en paren met jongen.



Wulp

Wulp

Wulp heeft een lang en gelijkmatig omlaag gebogen snavel. Het verenkleed is licht van kleur met donkerbruine verticale strepen over het gehele lichaam.

Biotoop:

Akkers, graslanden, heide, hoogveen, rivieren, wad

Voedsel- en broedbiotoop:

Wulpen broeden in diverse open tot tamelijk gesloten biotopen van kwelders, graslanden, hoogvenen van taiga's, duinen, akkers en heidevelden.



Voedel:

Regenwormen en andere ongewervelde bodembewoners

Broedperiode:

Maart – mei

De broedperiode loopt van begin maart tot midden augustus. Vanaf begin maart balts en van midden maart– midden augustus nesten en paren met jongen.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.

Zomertaling

Zomertaling

Mannetjes hebben een brede witte streep boven het oog die doorloopt tot in de nek. De borst is bruin, de flanken fijn grijs gebandeerd en de spitse schouderveren zijn zwart-wit. Vrouwtjes lijken sterk op vrouwtjes wintertaling maar zijn groter, missen de witte streep op de staartzijde en hebben een vaag gestreepte kop



Biotoop:

Graslanden, moeras, weiden (kleinschalig)

Voedsel- en broedbiotoop:

Zomertalingen zoeken hun voedsel in kleinschalige plassen en in sloten door natte weiden en hooilanden. Ook verlandingszones van moerasgebieden kunnen een geschikte biotoop voor de zomertaling vormen. Belangrijk zijn een natte, kruidenrijke vegetatie gecombineerd met een goede waterkwaliteit.



Voedel:

insecten en andere waterbeestjes maar ook plantaardig materiaal

Broedperiode:

Mei - Juli

Broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. Begin april balts, van april-augustus nesten en paren met jongen.



Scholekster

Scholekster

Zwarte kop en zwart bovenlichaam en een wit onderlichaam. Lange roodoranje snavel.

Biotoop:

Graslanden, intergetijdenzone, kust, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:

Scholeksters zijn zowel weidevogels als kustvogels. In beide biotopen kunnen ze volop aangetroffen worden. Het nest is niet meer dan een klein kuiltje in de grond.

Voedel:


wormen en insecten(larven).

Broedperiode:


April - mei

Broedduur inclusief eileg: 28 dagen

Kuikens: verlaten direct het nest en worden gevoerd door de ouders. Vliegen na 4 weken



Deze kaart is gebaseerd op data uit het Jaar van de Scholekster. Weergegeven is het aantal broedparen per vierkante kilometer.



Deze gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet. Weergegeven is het gemiddeld aantal vogels per hoofdgebied.